


ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Pays d'Iroise



©Eric Engbretson

Avis de recherche

Truite commune

Latin : *Salmo trutta*

Breton : dluzhenn

La Truite commune est une espèce de la famille des **Salmonidés** (au même titre que les saumons et les ombles).

Ceux-ci sont des poissons dits **anadromes** : ils remontent les fleuves depuis la mer pour s'y reproduire.

La Truite commune est une espèce à caractère migrateur facultatif.

Elle possède une **forte capacité adaptative**.

La truite de rivière, aussi appelée fario ou résidente, vit dans les cours d'eau douce. Elle remonte vers les sources des rivières en automne pour se reproduire et pond dans du gravier meuble, dans des zones à courant faible appelées **frayères**. Les jeunes (**alevins**) émergent au printemps.

Dans sa forme migratrice, la truite de mer effectue une migration en mer (à moins de 100km de l'embouchure de la rivière) où elle restera 4 à 14 mois pour y grandir, avant de remonter les cours d'eau pour la reproduction.

En Bretagne on peut rencontrer deux formes écologiques de truites, bien qu'il s'agisse génétiquement de la même espèce, la Truite commune :

- La **truite fario** ou truite résidente a une robe marquée de points rouges et noirs auréolés de taches plus claires. Au-dessous de la ligne latérale, la couleur est jaune vert et les nageoires orangées. Certains individus de fario possèdent des gènes activables pour évoluer vers la forme adaptée au milieu marin.
- La **truite de mer** arbore une robe argentée et des nageoires grises à blanchâtres. Elle ne présente pas de points rouges.




Truite fario



Truite de mer

©Jean-Marcel Leboucher



Répartition des formes de la Truite commune en France, MNHN-SFI, 2019

La Truite commune n'est pas considérée comme menacée en Bretagne, cependant la responsabilité biologique de la région pour sa conservation est très élevée, par rapport à l'état des populations françaises. Les principales menaces pesant sur l'espèce sont la **dégradation de ses habitats** (obstacles à la migration sur les cours d'eau, réchauffement des eaux...) ainsi que les échanges de gènes induits par les **repeuplements avec des juvéniles d'élevage**, qui affaiblissent les adaptations locales.

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité, nous souhaitons affiner la répartition de la Truite commune dans les cours d'eau du Pays d'Iroise. Si vous en observez, faites-le nous savoir !

Transmettez vos observations sur la carte interactive de l'Atlas de la Biodiversité : <https://arcg.is/1PP1efO>

Si vous avez des questions :

chloe.thebault@ccpi.bzh 02 98 38 45 82



ATLAS
BIODIVERSITÉ
PAYS D'IROISE